

A hosszú böjt veszélyes lehet

Ásjsra

Ás Ásjsra "áÉzdivatba" jÁjn a bÁjttÁllÁs, mint az egÁszsÁgmgörzÁs egyik eszkÁze, sokan bibliai alapokra is hivatkoznak, bÁjr a SzentÁrÁsban egÁszsÁgÁgyi bÁjtról sohasem olvasunk. Az iszlÁm vallÁsban pedig a Ramadan idejÁn 40 napos bÁjtt tartanak a nappali időszakban. Ugyanakkor Áppen a Ramadan ideje alatt megnő egy ritka tÁpusÁgyi ÁrkatasztrÁfÁnak a gyakorisÁga, amely az agyi vÁnÁjk trombotikus elzÁrÁdÁsa miatt jÁjn lÁtre. A vizsgÁlati adatok szerint ennek a tÁpusÁ stroke-nak a gyakorisÁga majdnem hÁromszorosÁra nő a bÁjti időszakban. ValÁszÁnű, hogy az egÁszsÁges bÁjttÁllóknl nem nagy mÁrtÁkű a kockÁzat, ugyanakkor a fogamzÁsgÁtlÁt szedők, vÁravadÁsi betegsÁgben szenvedők kÁrÁben a hiÁnyos vÁzbevitel Ás az ÁhezÁs egyÁttes hatÁsÁra komoly egÁszsÁgkÁrosodÁs jÁhet lÁtre. EzÁrt a hosszÁ bÁjttÁllk semmikÁppen nem javasoltak. (HealthDay News 2008. Április 15.)