

A metamfetamin tönkre teheti az ereket

A metamfetamin szörnyűségek (pl.

Ecstasy) használata rendkívül népszerű a fiatalok és a középkorúak körében, igazi party drogként, ami feldobja a hangulatot, felgyorsítja és fokozza a májmorosultságot. A legújabb tapasztalatok azt mutatják, hogy a máj ismert káros pszichés és szellemi problémák mellett ezek az anyagok súlyosan károsítják az ereket, azon belül is a verőereket.

Egy fiatal nő, akik metamfetamin használtak, hirtelen beszédzavarokkal és nagyfokú gyengeséggel kezdtek el kóroskodni, majd a vizsgálat kimutatta, hogy a nyaki erek meggyengülése miatt súlyos stroke-ot kaptak, melyből felgyógyultak ugyan, de maradtak maradandó károsodásaik. Mivel a metamfetaminon kívül más kockázati tényezők nem voltak a betegségre, így csakis a szerre vezethető állapotuk romlása. A jelenség maga egyébként nem ismeretlen, a kokainnal kapcsolatban ugyanerről már beszámoltak. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az ateroszklerózis hatására a pszichostimulánsok használata egyik súlyos következménye, ezért mindent meg kell tenni használatuk visszaszorítására. (HealthDay News 2006. december 26.)